


Gentile Paziente,

in questo modulo vengono riassunti i concetti a Lei già espressi verbalmente, precisandoli e definendoli nelle loro linee essenziali, in modo da avere anche per iscritto il Suo assenso all'esecuzione del trattamento prescritto e concordato.

### **NOZIONI GENERALI:**

La circoncisione è un intervento chirurgico praticato nei casi in cui si verifica un restringimento del prepuzio, cioè del rivestimento cutaneo mucoso del glande, che impedisca o ostacoli lo scorrimento del prepuzio stesso sul glande rendendo difficoltosi i rapporti sessuali e la cura dell'igiene dei genitali (immagine). Può complicarsi con la parafimosi quando il prepuzio retratto, provocando gonfiore dei tessuti, non può essere riportato a ricoprire il glande. Se il paziente è affetto da balanite suppurativa (grave infezione purulenta della pelle) è consigliabile posporre l'intervento sino a guarigione avvenuta, che può essere facilitata con un'incisione della raccolta purulenta e con adeguata terapia antibiotica. In tutti gli altri casi, l'infiammazione guarisce con l'esecuzione della circoncisione. Può essere utile praticare lavaggi della cute della zona interessata con soluzioni disinfettanti nei giorni precedenti l'intervento.



### **MODALITA' DI ESECUZIONE:**

L'intervento è eseguito agevolmente in anestesia locale. In casi particolari o nei bambini può essere utilizzata l'anestesia generale. S'incide la parte di prepuzio considerata esuberante e la si asporta. Si pratica l'emostasi (blocco dei vasi sanguinanti) e si sutura con piccoli punti che saranno spontaneamente riassorbiti.

### **POSSIBILI COMPLICANZE:**

Un lieve sanguinamento dalla sutura o secrezione sierosa possono essere presenti nei primi giorni dopo l'intervento. Molto frequentemente compare gonfiore o ecchimosi sulla pelle del pene, tendente a risolversi spontaneamente senza bisogno di terapie nell'arco delle settimane successive.



## CONSENSO INFORMATO CIRCONCISIONE

All.93 PG 13  
Redatto da: GL  
Verificato da: RGQ  
Approvato da: DIR  
Edizione: 00 - Revisione: 00  
Data di emissione: 09.05.2022

Sono estremamente rare.

Abbondante Sanguinamento: In genere è sufficiente una compressione manuale per qualche minuto, più raramente si devono applicare dei lacci sui vasi sanguinanti.

Infezione: E' trattata con antibiotici.

Distacco della cute dell'asta dalle corone per mancata tenuta dei punti chirurgici: Guarisce spontaneamente e non richiede trattamento.

Aderenze tra la superficie interna del prepuzio ed il glande: Possono essere corrette con la sezione chirurgica.

Cisti da inclusione: Sono causate dall'introflessione di una piccola parte di pelle, possono essere escisse chirurgicamente.

Fistole tra uretra e pelle: Sono corrette con una plastica uretrale dopo adeguato periodo d'attesa (6 mesi).

Stenosi del meato (non evidenziata precedentemente in quanto coperta dalla fimosi): E' corretta consensualmente o in un secondo momento

### **BENEFICI:**

La fimosi non permette al glande di essere libero e ciò comporta infezioni, nonché notevoli difficoltà durante i rapporti sessuali fino a casi estremi, quando non permette la minzione. La circoncisione consentendo al glande di essere libero risolve i problemi relativi alla fimosi. I risultati sono soddisfacenti e tali restano per sempre nella stragrande maggioranza dei casi.

### **ALTERNATIVE:**

La circoncisione è un intervento chirurgico il cui scopo è di asportare il prepuzio (quel cappuccio di pelle che copre il glande quando il pene è flaccido), in modo da mantenere il glande perennemente scoperto. Esistono poche alternative all'intervento di circoncisione e tutte mirano alla asportazione del tessuto prepuziale.

### **Osservazioni di rilievo nel caso specifico:**

---

---

---

---

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro di essere stato correttamente informato dal Dr. \_\_\_\_\_ e di aver compreso lo scopo e la natura dell'intervento di circoncisione descritto nel presente modulo. Dichiaro, altresì, di essere stato adeguatamente edotto sulle tecniche utilizzate, sui benefici derivanti dal trattamento, sui possibili rischi e complicanze ad esso connesse e sulle eventuali alternative.

Presto pertanto l'assenso al trattamento che mi è stata descritto e consegnato, per presa visione, con il presente consenso informato.

Il medico

---

Il paziente

---